





**3 ระยะของโรคไข้เลือดออกที่ต้องระวังในเด็กเล็ก !!**

**ระยะไข้ขึ้นสูง**  
  
ไข้สูงเฉียบพลัน 38.5-40.5 องศาเซลเซียส  
ปวดเมื่อยข้อต่อ ปวดตามกระดูกและกล้ามเนื้อ  
คลื่นไส้ อาเจียน  
ตุ่มผื่นแดงตามลำตัว  
**2-7 วัน**

**ระยะวิฤตตีหรือระยะช็อก**  
(จนถึงขั้นเสียชีวิตได้)  
  
เวียนศีรษะ ซึบง่วงซึม  
การซึมลงหน้าอก  
อาการคลื่นไส้อาเจียน (อาเจียนสีน้ำตาล)  
**ไม่แน่นอน**

**ระยะที่เห็นตุ่ม**  
(หากไม่มีอาการช็อกในระยะเวลาที่ 2 อาการป่วยจะดีขึ้น)  
  
ขึ้นขุยแดงเป็นจุด  
เริ่มมีสีม่วงตามข้อ  
เริ่มจับปื้นตามลำตัว  
ตุ่มพุดได้ทั่วตามตัวและใบหน้า  
**2-3 วัน**

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



